摛藻堂四庫

全書

薈


曾要


子部


欽定四庫全書管要 母暴醫宗金雖卷六十二


詳校官主事臣陳木


THIF 御暴醫宗金鑑卷六十二 欽定四庫全書舊要 · 足日華 全書 | 編輯外科心法要決目録 仙方活命飲 清熱消風散 殤主治類方 乳香黄香散 神授衛生湯 卸裝翻宗金鄉





























金页四库全書 生肌類方 去腐類方 **薑**攀散 紅升丹 白降丹 輕乳生肌散 生肌定痛散 元珠膏 卷六十二日録

瑩珠膏 呂祖一枝梅 生肌王紅膏 五色靈藥 月白珍珠散 腐盡生肌散 į 卸暴醫宗金墨








次足四事全書 御祭野宗金鑑 神授衛生湯 皂角刺一錢 此方治癰疽發背疔瘡對口一切丹瘤惡毒諸證服 歌仙方活命飲平劑瘡毒癰疽俱可醫未成即消克 兩實之劑功效甚速 之宣熱散風行瘀活血消腫解毒疏通減府乃表裏 銀赤芍宜乳沒天花防貝正陳皮好酒共煎之 腫去已成膿化立生肌穿山皂刺當歸尾草節金 防風六分

歸尾一錢 羌活人 沉香六分 大黄酒 石决明六分 甘草節一錢 右十五味水二碗煎八分病在上部先飲酒一杯黄二錢 乳香五分 連翹六分 白芷六分 紅花六分 天花粉一錢 卷六十二

清熱消風散 惡寒內不便秘惟紅腫焮痛高腫有頭者宜服此樂 此方治癰疽瘡腫已成未成之際無表無裏故外不 歌神授衛生表裏刺離直諸瘡惡毒良行於活血兼 消腫表裏疎通實劑方皂刺防風完正甲連翹歸 後服藥病在下部先服藥後飲酒一杯以行藥力 尾乳沉香金銀石决天花粉甘草紅花共大黄 如氣虚便利者不用大黃




次已日車全書 脚暴醫宗金鐵 乳香黄香散 紅花一錢 歌清熱消風無表裏癰疽諸毒和解方皂刺防風陳 此方治癰疽發背諸毒疔瘡疼痛不可恐者乃氣虚 右十五味水二鍾煎八分食遠服 加香附良 翹粉柴谷芎芍草耆當銀花倉术紅花入婦女還 若婦人加香附子用童便炒

當歸一錢 甘草節一錢 陳皮一銭 乳香五分 川芎一錢 人参一錢 不勝毒之故也服之未成即消已成即潰不用刀砭 惡內自脫并治打撲損傷筋骨疼痛之證 沒樂五分 白芍一錢 熟地一线 生苗香一錢 **聚設一錢**

内球黄連湯 躁嘔氓舌乾口渴飲冷等證六城沉數有力者急宜 歌乳香苗香治氣弱癰疽諸毒痛難當未成即消已 服之以除裏熱 此方治癰疽陽毒在裏火熱發狂發熱二便秘澀煩 撲筋骨傷 成潰歸与參考芎地黃乳沒栗陳甘草節更醫打 右水二鍾煎八分量病上下食前後服之 印家野於金點

欽定四庫全書 | 黄芩一线 薄荷一錢 當歸一 桔梗一 山梔一錢 歌内疎前、連寫裏熱離瘡毒大陽威狂腫硬發熱二 右水二茶鍾煎八分食前服加塞二匙亦可 錢 甘草五分 檳榔一錢 白芍一錢 大黄二錢 連翹一錢 黄連一錢


回陽三建湯 凉者並急服之 此方治癰疽發背初起不疼不腫不紅不熱堅如頑 人参一錢 石硬若牛皮體倦身凉脈息遲細色似土硃栗頂多 芍木檳榔 孔孔流血根脚平散較陷無膿皮不作腐頭温足 秋煩躁乾嘔渴飲凉梔翹薄草苓連桔大黄歸 The Lotter Town Land 附子一线



竹葉黄耆湯 此方治癰疽發背諸般疗毒表裏不實熟甚口中乾 歌回陽三建治陰疽體倦身凉蜒細遲不腫不疼不 **芎草茯香枸杞紅花與紫草獨陳為樸木山萸** 紅熱堅如頑石硬如皮根平輕陷無膿腐參附歸 氣為要 棉帛覆益瘡上常合温暖不得大開瘡孔走泄元 一碗煎八分入酒一杯隨病上下食前後服之用 1. d.15 卸票醫宗金監 t

鱼灰四厚在清 竹葉十片 麥冬八分 石膏煅 人多八分 白芍八分 大渴者服之生津止渴 右十二味水二鍾薑三片燈心二十根煎八分食 黄芩八分 甘草八分 當歸八分 半夏八岁 生地二錢 生黄香八分 卷六十二


内消散 知母一錢 勢大者雖不全消亦可轉重為輕移深居淺 此方治癰疽發背對口疔瘡乳癰無名腫毒一切惡 瘡能令癰腫內消使毒內化尿色赤污從小便而出 歌竹葉黃耆口乾渴清熱補正助生津參耆膏夏麥 遠温服 冬地芍草芎歸竹葉苓 卸暴醫宗金經 貝好一錢



ここうき 歌内消散用化諸毒毒化從尿色變行知貝天花乳 敷毒即平 夏及穿山角刺共金銀樂查搗和芙蓉葉白蜜調 後形勢已成則宜托裏消毒等湯使毒現於外以 而表裏之證相和者宜服病退即止如過七日以 已上諸方治癰疽七日以前瘡勢未成形體壯實 速其膿若仍用前散下之樂恐傷元氣致生變證 ノンラ 卸暴野京金塩 九

内固清心散 鱼灰四库全書 甘草二錢 冰片 錢 辰砂二錢 此方治癰疽發背對口疔瘡熱甚掀痛煩躁飲冷其 **装豆粉二两** 人内弱服之預防毒氣内攻於心也 元明粉二錢 雄黄二錢 茯苓二錢 人参二錢 乳香二錢 白豆蔻二錢 卷六十二


琥珀蠟礬丸 歌内固清心防毒攻內弱毒氣入心中掀痛熱甚兼 此方治癰疽發背瘡形已成而膿未成之際其人即 不虚弱恐毒氣不能外出內攻於裏預服此九護膜 草乳香同 飲冷豆粉人參水片雄長砂白蔻元明粉茯苓甘 服 右十味為細末每服一錢五分蜜湯調下不拘時 即於野宗金監



護心散 欽定四庫全書 脚暴醫宗金鑑 硃砂一錢 **装豆粉**一两 此方治瘡毒內攻口乾煩躁惡心嘔吐者服此藥護 歌琥珀蠟礬治癰毒未出膿時平劑住預服護膜能 心解毒也 解毒蠟醬雄珀蜜硃砂 者早晚服其功最速 乳香草栽 甘草一錢


透膿散 生黃耆四錢 毒出 川芎三錢 歌護心散治毒內攻煩躁口乾嘔逆冲豆粉乳香味 此方治癰疽諸毒内膿已成不穿破者服之即潰破 共草二錢調下有神功 右四味研細末每服二錢白滾湯調服早晚二次 當歸二錢 穿山甲一錢

飲定四庫全書 卸暴醫宗金鑑 托裏消毒散 皂角刺五分 其腐化也宜服此藥托之令其速清則腐肉易形而 此方治癰疽已成內潰遲滯者因血氣不足不能助 歌透膿散治膿已成不能潰破劑之平用此可代鍼 藥瘡在下先服藥後飲酒一杯 寫毒角刺歸香山甲芎 右五味水三鍾煎一鍾磨在上先飲酒一杯後服



神功内托散 記定四車全書 柳縣醫宗金鑑 黄香 线 歌托裏消毒助氣血補正脫腐肌易生皂角銀花甘 川芎 潰脈細身凉宜服此温補托裏之劑以助氣血也 此方治癰疽腦頂諸發等瘡日久不腫不高不能腐 桔芷芎耆歸芍术參苓 附子一義 白术一錢五分 歸身二錢 ナ

復元通氣散 陳皮一錢 白芍一錢 穿山甲少分 歌神功內托陰毒證不腫不高不潰疼參附芎歸耆 食速服 术芍木香山甲草陳苓 右十二味煨薑三片大棗二枚水二茶鍾煎八分 木香五分 甘草五分 白茯苓一錢




雙解貴金丸 此方治背疽諸毒初起木問堅硬便秘無沉實者悉 效隨證加樂服法列後 翹草一服能教毒氣通 出汗過三二時俟大便行一二次立效 右二味為末水丸每服三五錢五更時用連鬚葱 大者三根黃酒一碗煮葱爛取酒送藥服畢盖臥 白近十两 巻六十二

黍米寸金丹 歌雙解貴金治諸毒腫傷初起木硬堅大黃白並為 按此宣通攻利之劑也濟之以葱酒力能發汗故云 此方乃異人所傳常有暴中急證忽然卒倒者撬開 再 虚人每服一錢用人參加生薑煎湯送下過一時 雙解弱者随用中劑行後以四君子湯補之老人 服葱酒煎送汗下痊 服得睡上半身得汗則已 印京野宗金監 五


歃 硇 狗 拘膽 乳香 定四庫全書 | 重者不分表裏老幼輕重並宜服之 牙關研灌三九其人即活又能治發背癰疽偏身壅 腫附骨癰疽等證也凡初起憎寒壮熱四肢倦怠沉 砂二錢 乾一 個十 麝 鯉魚膽 蟾 沒樂各一錢 打香五分 卷六十二 酥二錢 酥炙 者七條 陰三 乾個

雄黄一 黄蠟三錢 歌黍米寸金奇效方癰疽發背服之良乳香沒藥狗 頭 、胎男乳 右十六味為細末除黄蠟乳汁二味熬成膏子同 藥和丸如菜豆大小兒用一丸大人三丸重者五 今透風汗出為度諸病如失 九冷病用葱湯熱病用新汲水送下衣被密蓋勿 垂錢 印京新西宗会監 烏金石一錢 輕粉一錢 水銀煉粉霜白色者三錢



欽定四庫全書 即 部第醫宗金鑑 保安萬靈丹 此方治癰疽疔毒對口發頤風寒濕痺濕痰流注附 歌麥靈丹治疗毒疽鮮蟾酥與活蜘蛛定心草共飛 五九在上俱用滚白水服在下用淡黄酒送服每 子形如麥子大每服七九重大者九九小兒輕證 羅麪黃南熱膏相合宜 料加麥子一合以磁罐内

右四味共研一處用菊花熬成稀膏和好然為麥




飲定四庫全書 刷暴醫宗金器 何首馬各一两 甘草 全蠍 罐收貯視年歲老壯病勢緩急斟酌用之如惡瘡 右十六味為細末煉蜜為丸重三錢硃砂為衣磁 嘔吐四肢沉重恍惚悶亂皮膚壯熱及傷寒四時 者狀若傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛惡心 初起二三日間或癰疽已成至十日前後未出膿 雄黄六錢 當歸 天麻


煎湯調服一丸蓋被出汗為效如汗遅以葱湯催 感胃傳變疫證惡寒身熱俱宜服之用葱白九枝 榮衛不調氣血凝滯始生癰腫此藥專能發散又 載諸風癱為門中今移録於此者益瘡寫皆起於 表裏相兼不必發散只用熱酒化服又按此方原 自快瘡未成者即消已成者即高腫潰膿如病無 之其汗必出如淋如洗令其自收不可露風患者 能順氣搜風通行經絡所謂結者開之也經云汗

飲定四庫全書 ₩ 御暴醫宗金盤 腫瘍敷貼類方 歌萬靈丹治諸痺病此樂猶能治腫傷發表毒邪從 **芎石斛蒼全蠍當歸甘草等天麻何首共雄黃** 房事如婦人有孕者勿服 也然亦不可太過過則毒為寒凝變為陰證如漫 凡腫瘍初起時腫高赤痛者宜敷凉藥以寒勝熱 汗解通行經絡效非常麻黃羌活荆防細川草鳥 之則瘡已正與此相合也服後當避風忌冷物戒

如意金黃散 此散治癰疽發背諸般方腫跌撲損傷濕痰流毒大 者為血脈通熱氣散也反此者逆 裂不時用原汁潤之蓋借濕以通竅乾則藥氣不 藥須多攪則藥稠黏敷後貼紙必須撕斷則不崩 腫不紅似有頭而不痛者宜敷温藥乃引毒外發 入更添拘急之苦矣凡去數藥必看毛孔有汗意 也經云發表不遠熱數熱藥亦發表之意凡調數



搗汁調敷加蜜亦可湯於大燒皮膏破爛麻油 元熱色亮遊走不定俱用蜜水調數如天泡火丹 赤遊丹黃水漆瘡惡血攻注等證俱用大監根葉 時俱用茶清同審調數如欲作膿者用葱湯同蜜 罐勿泄氣凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者及夏月 右十味共為咀片晒乾磨三次用細絹羅篩貯磁 一膝風等證俱用葱酒煎調數如風熱所生皮膚 東如漫腫無頭皮色不變濕痰流毒附骨癰疽



歌五龍膏用拔膿毒平劑五龍草銀花簽草車前俱 車前草連根 并飛鹽末二三分共搗為稠糊編數磨上中留一 方內五龍草或缺少不便倍加豨簽草亦效 下陰乾為末用陳米醋調數一如前法并效如此 項用膏貼盖避風為主若冬月草無鮮者預採蓄 右四味俱用鮮草葉一處搗爛再加三年陳小粉 爛小粉飛鹽攪糊茶 陳小粉谷等


四虎散 欽 草鳥 此方 半夏 此散治癰疽腫硬厚如牛領之皮不作膿腐者宜用 定四庫全書 歌四虎散數陰疽癰頑腫不痛治之平厚似牛皮難 清腐草烏狼毒夏南星 右四味為細末用猪腦同搗倫敷磨上留頂出氣 御祭醫宗金鑑 南星分等 狼毒 主

真君妙貼散 白麵五的 數之不痛者即痛痛者即止如皮破血流濕爛疼苦 天泡火丹肺風酒刺等證并用之皆效 此散治癰疽諸毒頑硬惡瘡散漫不作膿者用此藥 右三味共一處用清水微拌乾濕得宜趕成薄上 晒單紙包裹風中陰乾收用臨時研細末新 明净硫黄十

一青散 青黛 白飲 此散治一切陽毒紅腫疼痛界熱等證未成者即消 歌真君妙貼硫二麵水調 水調數如皮破血流濕爛者用麻油調數天泡火 血痛散汁泡丹酒刺 酒剌者用散汁調搽并效 甲族醫宗会整 黄檗 白薇香 風 頑硬不痛膿油調濕爛流 Ě

欽定四庫全書 | 白鮮皮各 大黄四兩 白芷 青露三两 歌二青散用敷陽毒腫痛紅熱用之消黛襞飲被青 編敷 露及正龍鮮粉大黃消 右十二味為末用醋蜜調敷已成者留頂未成者 朴消一兩 水龍骨船舊 白及 天花粉三兩 油年 灰絵

坎宫錠子 能膽三錢 牛黄三分 兒茶二錢 京墨一 此錠子治熱毒腫痛焮赤諸瘡并搽痔瘡最效 右七味為末用豬膽汁為君加生薑汁大黃水浸 取汁職醋各少許相和藥成錠用凉水磨濃以筆 兩 和 京野 京 金 監 麝香五分 氷片七分 胡黄連二錢 Ē



白錠子 蟾酥三錢 痔耳挺等證 此錠專數初起諸毒癰疽疔腫流注痰包惡毒及耳 歌離宫錠治諸疗毒漫腫無頭凉水塗血竭殊砂為 白降丹即白靈藥 右六味為末凉水調成錠凉水磨濃塗之 細末膽礬京墨麝蟾酥 45 御京整宗金鑑 銀熟二錢 麝香五分錢 莹

蝌蚪拔毒散 新 庆 四 库 全 書 寒水石二錢 此散治無名大毒一切火毒瘟毒數之神效 歌白錠專數初起毒癰疽方腫與痰包降丹銀熟人 消毒 中白寒水白及醋研消 右四味共為細末以白及麵打糊為錠大小由人 不可入口每用以陳醋研數患處如乾再上自能 人中白二錢 卷六十二

一味拔毒散 歌方 拔毒散治無名毒火毒瘟毒俱可施寒水硝黄蝌 匀收磁罐内每用時以水調塗患處 水浸乾藥末水 15 卸京祭醫宗金點 大内内 净皮硝研 碗入前藥末各二兩陰乾再研府蝌蚪成羣大頭長尾者 調 Ž 末極 卖

쉷 四陽王龍青 明雄黄 歌二味故毒消紅腫風濕諸瘡痛癢寧一切肌膚疥 灰 匹 厚 全 書 此散治風濕諸瘡紅腫痛癢疥疿等疾甚效 此膏治癰疽陰瘡不發熱不舉痛不腫高不作膿 **疿疾雄礬為末用茶清** 右二味為末用茶清調化蔥翎蘸掃惠處癢 紅腫即消 白礬谷等 卷六十二

ĸ 赤芍芝两 E 日 上 A dan 一 和蒙醫宗金鑑 草鳥三兩 **槩敷之俱有功效** 寒熱流注冷痛痺風脚氣手足頑麻筋骨疼痛及 歌回陽玉龍陰毒證不熱不疼不腫高軍薑桂芍 切皮色不變漫腫無頭鶴膝風等證但無肌熱者 右六味製畢共為細末熱酒調敷 白止 南星 肉桂五錢 ार्येया 兩 芝

冲和膏 金欠日月白雪 紫荆皮五兩 白芷三雨 數之能行氣疎風活血定痛散瘀消腫祛冷輕堅誠 此膏治癰疽發背陰陽不和冷熱相凝者宜用此膏 石菖蒲五 烏芷研末須將熱酒調 <u>(</u> 錢兩 赤芍二柳西 卷六十二


鐵桶膏 てこり 膽攀三錢 歌冲和發背癰疽毒冷熱相凝此藥數行氣疎風能 麝香三分 此膏治發背將潰已潰時根脚走散瘡不收束者宜 用此樂園敷 活血紫荆獨正芍菖蒲 石五味共為細末葱湯熱酒俱可調敷) 15 御寶茶醫宗金鑑 銅緑五錢 白及五錢 主

五倍子微 粉二錢 矣 鐵桶膏收毒散大周圍數上東應根膽礬銅綠及 蓋樂上瘡根自生緣紋漸收漸緊其毒不致散大 攪八醋內此温用新筆塗於瘡根周圍以棉紙覆 至 右八味共為極細末用陳米醋一 小杯候起金色黄泡為度待温用藥末一錢 炒两 明礬四錢 鬱金二錢 碗 杓内慢火熬


釤

定匹庫全書


卷六十二




神效干槌膏 金 克 匹 厚 至 1 銅緑一 土木繁五 出大人臁瘡小兒蝖拱頭等證並效 此膏專貼磨傷行毒初起貼之即消治療應連根拔 歌烏龍膏用治諸毒赤暈能收治腫瘍木鱉草鳥小 粉夏凉水調敷功效良 出毒氣 殻個 乳香二錢 白嫩松香椒 卷六十二




釒 **定四月百十** 甚有功效所治諸證列後 馬齒克性味清凉能解諸毒今用此一味或服或數 治楊梅倫身如賴喉硬如管者取莧碗粗一握 治多年頑瘡臁瘡疼痛不收口者杆見數之取蟲 治發背諸毒用見一握酒煎或水煮冷服出汗再 服退熱去腐三服即愈并杵莧敷之 水煎服出汗 日一換三日後腐肉已盡紅肉如珠時換生肌 卷六十二 酒




四物湯 四君子湯 金贞四周白書 白术各二錢 潰瘍主治類方 へ参 根相和宜 汁用婦女陰瘡共黛施濕癬白禿加灰末丹毒藍 右四味薑三片東二枚水煎服 茯苓 甘草 卷六十二






大己日年 在 十二 如寒醫宗金鑑 刺以消硬也已上諸方凡癰疽潰後諸虚者悉準 四君子湯補氣不足者也四物湯補血不足者也 避其燥能亡津也加遠志麥冬者以生血生津也 少加陳皮以行氣之滯五味子以收飲氣血遠志 以生心血也內補黃耆湯治潰瘍口乾去白术者 血諸不足者也人冬養榮湯去川芎者因面黃血 ,珍湯雙補血氣不足者也十全大補湯大補氣 痛者加乳香沒藥以定痛硬者加穿山甲皂角 圭


異功散 陳皮五分 歌四名参苓白术草四物芎歸芍地黄二方雙補八 珍是更加香桂十補湯榮去芎加陳遠味内去水 加速冬良痛甚乳沒硬穿皂潰後諸虚斟酌方 於此當隨證酌用之 甘草 大





? 六君子湯漬後氣虚有痰者宜之六君子湯加霍 四君子湯加陳皮名異功散潰後脾虚氣滯者宜 潰後氣虚有寒加內桂附子潰後寫者加訶子肉 虚寒滯者宜之蓋氣虚則陽虚陽虚生寒故於補 嘔吐者宜之無痰飲氣虚嘔逆甚者加丁香沉香 香或木香砂仁名香砂六君子湯清後胃虚痰飲 氣藥中加温熱之味也四君子湯加陳皮半夏名 之四君子湯減茯苓加乾薑名曰理中湯潰後脾 A. A.15 御寨醫宗金鑑 弄

托裏定痛湯 金灾四屋石河四 歌四君加陳異功散理中減苓加乾薑有痰凍半六 冬五味子渴者加乾萬傷食脾胃虚弱加山查神 **蔻栗滑腸咳桔冬味湯加葛傷食查麵穀麥良** 君子嘔吐砂仁木藿香逆加丁沉寒桂附寫加訶 為主隨證加減也 **麵穀并或麥芽此皆潰後氣不足者以四君子湯** 豆蔻腸滑不固加醫粟殼食少咳嗽者加桔梗麥 卷六十二



三黄四物湯 定四庫全書 按托裏定痛湯漬後血虚疼痛者宜之聖愈湯漬後 湯漬後六腑陽火煩熱者宜之蓋血虚則陰虚陰 蘗四物湯潰後五臟陰火骨蒸者宜之三黄四物 虚有寒熱者宜之地骨皮飲潰後不寒者宜之知 血虚内熱心煩氣少者宜之柴胡四物湯潰後血 於四物湯內加黃連黃苓黃蘗 於四物湯內加知母黃檗


欿

補中益氣湯 飲食無味脈洪大無力心煩氣怯者俱宜服之 補中益氣湯治瘡瘍元氣不足四肢倦怠口乾時熱 歌す 者入血虚血熱最相宜血虚寒熱小柴合惟熱加 丹地骨皮陽火煩熱三黄合陰火骨蒸加蘗知 四物加桂乳沒栗托裏定痛功效奇聖愈四物參 血不足者以四物湯為主隨證加減也 虚生熱故補血藥中多加寒凉之味也此皆潰後 印泉野宗金監

人參黃耆湯 新定四庫全書 甘草之錢 升麻三分 治潰瘍虚熱不睡少食或寒濕相凝作痛者效即前 生黃香二錢 人参一 五味子玩分 右下味水二種薑三片棗二枚煎一 一錢 陳皮五分 柴胡三分 雷歸一錢 麥冬去必 白术一线 鍾空心熱服

獨參湯 虚者宜服之 此湯治潰瘍膿水出多元氣虛餒外無邪氣自汗脈 方去柴胡加神麴五分炒蒼木五分炒黄蘗五分炒 人参二两 蘗減 柴方 補中益氣加麥味漬後見證同内傷麥者歸水升 柴草麥味陳皮引棗薑人參黃耆寒濕熱加麴蒼 印不管正在監


温胃飲 飲定四庫全書 W 呃逆中脘疼痛嘔吐清水等證宜急服之 此湯治癰疽脾胃虚弱或内傷生冷外感寒邪致生 歌膿水過多元氣餒不生他悉獨參宜徐徐代飲無 服之亦可 窮妙囊蓮元肉共煎之 服之若煎至稠厚即成膏矣作三次用醇酒熱化 右一味水二鍾棗十枚或蓮內元眼內煎好徐徐




橘皮竹站湯 鱼灰四庫全書 橘 生薑 歌橘皮竹如熱呃逆胃火氣逆上衝行橘紅竹站薑 此湯治潰傷胃火上逆氣衝以致時時呃逆身熱煩 渴口乾辱焦此熱呃也服之有效 多一錢 紅二錢 右六味水二種煎八分空心温 錢 柿蒂七個 黄連一錢 竹站三錢 巻六十二 服


一胃爱丸 建蓮肉五段 陳皮六 氣開胃口而飲食自進矣 此九治潰瘍脾胃虚弱諸味不喜者宜服此丸助脾 參 柿蒂虚加參補熱連清 用陳老米先炒黃色方 微 山藥男和 白豆蔻三錢 蒸 片 時 拌肥令大 連 入同炒 梗 葉 透上 微 t)) 栖白 片 燥 後者 胃勿 微切 焦 焙片

欽 雲片白水多芽 甘草三銭 歌方 定四庫全書 上白茯苓一兩切一分厚咀片用砂仁二錢同茯苓 梗葉建連白卷米糊力 不思飲食宜胃愛開胃扶脾效若仙異功山藥蘇 熬湯打糊丸梧桐子大每服八十九清米湯送 不 右九味共為細末用老米二合微焙碾粉泡荷葉 拘時服 拌鮮 炒出米泔浸去滥水切片 晒 乾 同





加味地黄丸 歌二神九治脾野弱飲食不化瀉黎明肉果補脾骨 熟地八兩 此九治癰疽已溃虚火上炎口乾作渴者宜服之 脂腎生薑煮棗肉丸成 切片水浸薑東煮至水乾為度取棗肉為丸桐子 大每夜半用清米湯送下七十九治腎瀉脾瀉甚 育 上葉炒两 里



k :) 雲片白术六两 宜用此補之 此膏治癰疽發背等證大潰膿血之後血氣大虚急 以上三膏各熬完畢各用磁罐盛之入水中待 氣自汗者以人参膏三匙白水膏二匙地黄膏 起密盖勿令泄氣如患者精神短少賴於言動 聽内 用妆再舫 4.5 年繁醫宗金鑑 貯煎切 汁片 一用 碗水 共五 懷慶熟地六 用大密碗 絹沙 濾鍋 熬兩 淨慢 同上法 敖敖 稠至 聖 厚三 磁碗 碗將

盆 灾匹 是人参膏二是地黄膏一是熱酒化服如腰膝疫 食减少或食不知味或已食不化者用白水膏三 各二匙熱酒化服此膏用於清晨及臨睡時各進 合一切瘡形危險勢大職多者服之自無變證也 月白一十 次自然強健精神頓生氣血新肉易長磨口易 腿脚無力皮膚枯稿者用地黃膏三匙參水膏 是俱用無反好酒一杯炖熟化服如脾虚弱飲 一匙化服如氣血脾胃相等無偏勝者三膏每


山藥六兩 歌祭术膏治大膿後血氣雙補此方宗人祭白术同 味食不作饑及平常無病久病者服之能健脾胃 此糕治癰疽脾胃虚弱食少嘔泄精神短少飲食無 夏天炎熱恐膏易變合作二次熬用亦好愈後常 熟地熬成膏服有奇功 服能鬚髮變黑返老還童已上諸方功難及此 印察醫宗金監 人多六两 墨

欽 蓮內六兩 白蜜一動 定四庫全書 粳米七升 白茯苓六兩 火上烘乾磁器收貯每日清早用白湯泡數條或 右將山藥人參蓮肉芡實茯苓五味各為細末再 將粳糯米為粉與上藥末和匀將白糖入蜜湯中 化隨將粉藥乘熱和勾攤鋪籠內切成條蒸熟 糯米七升 **芝實六兩** 白糖霜二兩半

洗滌類方 歌八仙糕用健脾胃食少嘔泄服之靈山樂人參梗 脊背者淋之在下部者浴之俱以布帛或棉蘸洗 潰腐而無壅滯也凡腫在四肢者渦潰之在腰 乾用亦可饑時隨用服至百日故脾壮胃功難筆 洗有湯滌之功條洗則氣血自然舒暢其毒易於 糯米蜜糖蓮炎白雲葵 甲不及為六白監 腹

葱歸渦腫湯 欽 定四庫全書 法如潰後俱用猪蹄湯燙洗用猪蹄湯者以助肉 **慈歸涓腫湯燙洗如陰證不起者俱用艾葺湯敷** 洗之不可間断凡洗時冬月要猛火以逼寒氣夏 之氣而逐腐也此滌洗之法乃寫科之要藥 月要明愈以避風凉若不慎此輕則有妨沒口重 温即易輕者日洗一次重者日夜洗二次每日 恐變純陰夫洗藥不一如初腫與將清者俱用 也

獨活三錢 甘草三錢 葱頭七 個 此湯治癰疽瘡瘍初腫將潰之時用此湯洗之以瘡 内熱養為度 歌苑歸渦腫洗諸毒初起將潰用之宜洗至熱養斯 湯熱洗如温再易之 右五味以水三大碗煎至湯醇濾去渣以絹帛煎 T LIKE MET NE AN ASS 當歸三錢 白芷三錢





|豬蹄湯 Al T La dun 卸家醫宗金盤 洗則傷水皮膚破爛難生肌肉飲口矣 散風脫腐止痛去惡內活死肌潤磨口如腐盡者不 此湯治癰疽諸毒流膿者熬好洗之以助肉氣消腫 歌文并數法治陰瘡黑陷不痛用之良石硫雄黃同 父用之當以米 泔水熱洗之令瘡潔净不可過洗過 **艾出搗爛温敷患處再煎再易十餘次為度 义煮捣成膏敷定能康** 野七

羌活各等分 黄芩 當歸 白並 微火煎十數沸濾去渣候湯微温即用方盤一箇 吹去汁上油花即用粗樂末一兩投於汁中再用 積豬前蹄一隻用水六碗煮蹄軟為度將汁濾清 右七味共為粗末看證之大小定藥之多少先将 赤芍 甘草 卷六十二

金牙口匠

٤ 9 歌豬蹄湯治癰疽毒已潰流膿用此方消腫散風能 靠身於瘡下放定隨用軟絹熊湯淋洗瘡上并 為度再以輕帛叠七八重蘸湯勿令大乾覆於瘡 即隨證以應用之藥貼之 上兩手輕按片時帛温再換如此再按四五次 孔内輕手捺盡内膿庶敗腐宿膿隨湯而出以净 Ē 一痛苓甘歸与正蜂羌 流通血氣解毒止痛去疾也洗訖用絹帛挹乾 A 4.5 一 節繁醫宗金監 哭






組珠膏 歌萬應膏用貼諸毒發背癰疽對口瘡川草烏同地 薄紙攤貼 鼓及象皮桂芷芍歸羌苦參木 驚穿鳥樂甘獨元 内慢火熬至藥枯浮起為度住火片時用布袋濾 参定粉黄 去渣将油稱準每油一動對定粉半動用桃柳枝 不時覺之以黑如漆亮如鏡為度滴入水內成珠


金分四月白雪

欴 定四車全書 柳察醫宗金鑑 製麻油四兩 雞疫核血風等詹及頭痛牙疼腰腿痛等證悉驗 此膏治一切癰疽腫毒流注頑臁風寒濕痹瘰癧乳 於血腫毒察應等證但未破者再加魏香散隨膏 數十次易水浸之聽用 之大小患之輕重每加半分至三二分為率 將麻油煎滚入松香文火溶化柳枝攬候化盡 - 細樂末二兩三錢攪勻即傾於水內抜扯 製松香一動


未破者貼之勿揭揭則作養痛亦勿揭能速於成 毒深膿不盡及頑磨對口等證雖潰必用此膏獲 頭痛貼太陽穴牙痛塞牙縫內 臁瘡及臀腿寒濕等瘡先用茶清入白礬少許洗 效 净贴之見效 絹帛攤貼 膿患在平處者用紙攤貼患在灣曲轉動處者用 卷六十二

製油法 ¢ N 日 和 在 本 一 御寒醫宗全鑑 内雞等證作九用蛤粉為衣服下 豆肉文蛤打碎山茨菇打碎紅芽大戟續斷各一 便毒痰核多加魏香散如膿瘡再加銅青如蟺拱 毎麻油 兩槐柳枝各二十八寸入油鍋內浸二十一日煎 頭癣毒貼之亦效 枯去渣取油聽用查朝鮮琥珀膏多續隨子此方 動用當歸木鱉子肉知母細辛白正巴 至





陀僧膏 等證用之有效 此膏專貼諸般惡瘡流注瘰癧跌撲損破金及候傷 歌方 麝香各減半 黄竭麝輕隨證更加魏香散麝香魏竭乳沒并核塊血風頭痛及牙疼松香化入麻油內乳沒雄 紺珠膏貼癰疽毒流注頑賺濕痺名瘭症乳癰痰 為末雖收聽用 老二十二




巴膏方 5日四日十四 歌陀僧膏貼諸惡瘡流注瘰癧跌撲傷陀僧赤芍歸 滴水不散再下吃僧末用槐柳枝攪至滴水籽欲 茶川大黄 磁盆内常以水浸之 成珠将百草霜細細節入攬匀再将晕樂及銀黝 乳沒亦脂苦參百草霜銀點桐油香油共血竭兒 篩入攪極匀傾入水盆內衆手扯千餘下再次 卷六十二

象皮六錢 香油 硇 山梔子八十個 此膏貼 頭髮 撈出次入象皮穿山甲人頭髮煤化再入山梔子 右將桑槐桃柳杏五枝用香油四觔將五枝煤枯 į 另三 研錢 J. 1. 1 兩二錢 極 切雞疽發背惡瘡化腐生肌甚效 細 末 卸暴醫宗金監 黄 兒茶二 穿山甲六錢 血 槐桃柳杏枝各五十寸 竭 另 研銭 研銭 極 極 細 細 末 末 五四

癰疽發背用巴膏象甲梔茶髮竭砌枝用桑槐桃 遍 柳杏黄丹攪和共油熬 須 融 水中成珠将鍋取起再入血竭兒茶硇砂等末覺 少頃每油一動入黄丹六兩攬匀用慢火熬至滴 枯用網將藥渣濾去將油復入鍋內煎滚離火 換水數次拔去火氣磁罐 用京水一盆將膏藥領入水內用手扯藥干餘 以銀杓盛之重湯此化薄紙 **收貯用時不宜見火** 攤 貼

歃


定四庫全書




英日屋 有 Three 歌亞聖膏治破爛磨楊梅結毒貼之良象聽鷄繁蛇 黄蠟 桑枝各二十一寸 貼 靈脂五錢右五味研極細末入膏內成膏出火攤 錢兒茶三錢乳香三錢沒樂三錢煅牡蠣五錢五 黄丹七兩煎成膏入黃蠟五錢化匀再加血竭五 右將樂浸七日煎如常法濾去渣每淨油一動 黄丹 蘇油三動 卷六十二

於 定 四 車 全 書 血竭三錢 蘇油十兩 珠膏 黄丹小飛 此膏治溃瘍諸毒用之去腐定痛生肌甚效 大麻子肉や十 没蠣靈寒 蟬蛇血甲槐榆芝柳桑丹蠟蘇油匀化後竭茶乳 御纂醫宗金鑑 殊砂二銭 白蠟三兩 鶏子黄十個 血 除五钱 粪

輕粉三錢 **冰片**一銭 後樂三錢 珍珠三錢 歌絳珠化腐主生肌蘇肉鶏黃油血餘丹蠟竭砂輕 枯去渣入蠟候化離火少時入黄丹攪匀再加細右將蘇油煤血餘至焦枯加蘇子肉鷄子黃再煤 樂和匀妆用攤貼 麝香五分 兒茶三錢 乳香三錢




加味太乙膏 筋骨走注作痛湯燙火燒刀傷棒毒五損內癰七傷 毒腸癰亦可丸服諸般瘡癬血風觸癢諸樂不止痛 外證俱貼患處又男子遺精女人白帶俱貼臍下職 此膏治發背癰疽及一切惡瘡濕痰流注風濕偏身 歌絳紅膏治毒已成腫痛難消用最靈一味銀朱為 細末桐油調和貼之平 卷六十二



味併槐柳枝用與蘇油足稱五動將藥浸入油內 徐投入大加大此夏秋元熱每油一動加丹五錢 象方算熬熟净油一 起為度住火片時用布袋濾净藥渣将油稱準用 春五夏三秋七冬十入大鍋內慢火熬至藥枯浮 右將白正當歸亦与元參肉桂大黃木驚生地 上慢火熬至血餘浮起以柳枝挑看似膏溶化之 細舊絹將油又濾入鍋内要清净為住將血餘投 動將飛過黃丹六兩五錢徐

欴 定回車到 試 鍋來方下阿魏切成薄片散於膏上化盡次下 水浸片時乘温每膏半動扯拔百轉成塊又換 漸 氣 不住手攪候鍋內先發青烟後至白烟叠叠旋 漸 輕粉攪匀傾入水中以柳 浸隨用時每取一塊銅杓內復化隨便攤貼 , 輕硬得中如老加熱油如稀加炒丹每各少 味香馥者其膏已成即便住火將膏滴入水 如火務要冬夏老嫩得所為住候烟盡掇 書 卸京醫宗金銀 棍摟成一塊再換冷 平九 許 冷




歌白膏專貼諸瘡毒巴豆乾蘇浸入油活鄉蝦養同 活鄉魚十足 煤後再将官粉乳香投 先將巴豆肉乾蘇子入油內浸三日再将蝦蟇浸 香末五錢不時攬之冷定為度用時重湯此化薄 滴水成珠離火傾於净鍋內再加官粉二動半乳 難貼 宿臨熬時入活鄉魚共煤焦去渣净慢火熬油 弈


化腐紫霞膏 輕粉三錢 金頂砒五分 螺蛳肉二兩 膿者用此膏以腐爛瘀肉穿潰膿毒其功甚效 此膏善能穿透諸毒凡發背已成瘀肉不腐及不作 巴豆仁研用白仁 右各為末共張一處磁確收貯臨用時用蘇油調 晒 乾 血竭二錢 為末 潮 腦一錢 卷六十二

貝葉膏 とこう 白蠟二兩 歌化腐紫霞膏穿毒透膿化腐效如神金砒潮 蘇油一 此膏貼癰疽發背一切潰爛諸磨 柳內粉竭 蘇仁巴豆仁 搽頹硬肉上以棉紙蓋上或膏貼俱可 右將血餘以文火煤化去渣下火入白蠟溶化候 į 1. 4.5 卸簽醫宗金盤 舳 血餘鷄子大一個 至 鶗 맳

碧螺膏 釒 歌方 灾匹**厚全**書 松香取嫩白者住為末節過用銅盆以豬油過茶此膏治下部濕瘡疥癬并結毒痰串麼瘡 貝葉膏治漬爛瘡去腐生肌功效強血餘麻油煎 **渣去下火入蠟化貼良** 痛去腐生肌其功甚速切勿忽之 温用棉紙剪塊三張張張於油蠟內熊之貼於磁 器帮上用時揭單張貼患處日換八九次力能定

飲定四車全書 | ■人 歌碧螺膏治於濕磨豬脂蘇油嫩松香再入糠青膽 麻藥類方 礬末緑紙攤貼效非常 緑紙薄攤貼之 老嫩取起離火住滚徐徐入糠青膽攀各净末五 錢以柳枝左攬与為度如老加熟豬油二三錢用 右將蘇油煎滴水成珠入松香 傾冷水中拔扯百十次以不 御纂醫宗金鑑 斷 為度 **動文火溶化看** 坌





生南星五錢 蟾酥四銭 此藥敷於毒上麻木任割不痛 川烏尖五錢 歌整骨麻樂取箭頭不傷筋骨可無憂麻黃薑黃胡 **茄子川草鳥與開手投** 煎湯服之即甦 生半夏五錢 胡椒一兩 草鳥尖五錢 卷六十二 飲定四庫全書 柳寨醫宗金鐵 去腐類方 歌外數麻樂調燒酒刀割不痛效最神川草烏蟾椒 能浸活好肉也當速去之如遇氣實之人則用刀 方加車发五錢一方加細辛 割之取效若遇氣虚之人則惟恃藥力以化之蓋 高者壞內也諸書云腐不去則新內不生盖以底 星夏一加華美一加辛 右為末用燒酒調數 吉


白降丹 炮消散成膿者即潰腐者即脱消腫誠奪命之靈丹 釐瘡小者用一二釐水調敷瘡頭上初起者立刻起 此丹治癰疽發背一切疗毒用少許磨大者用五六 去腐之藥乃屬科之要藥也 硒 雄黄各二錢 硼砂五錢


白礬 乾則汞走如不乾則藥倒下無用其難處在此再徐徐起藥入確化盡微大過令乾取起如火大太以水銀不見星為度用陽城確一個放微炭火上 先將硃雄硼三味研細入鹽醬硝皂水銀共研勾 鞋灰光粉三樣研細以鹽滴滷汁調極濕一層泥 和暴醫宗全盤 陽城確合上用棉紙截半寸寬將罐子泥 皂礬各一兩五錢 此丹治一切瘡瘍潰後拔毒去腐生肌長肉瘡口堅 火冷定開看約有一兩外藥矣煉時確上如有緑 碗內以瓦挨潭口四邊齊地恐炭灰落碗內也有 烟起急用筆熊確子鹽泥固之 藥確上以生炭火蓋之不可有空處約三炷香上 下挖一小潭用飯碗風水放潭底将無藥確放 層紙糊合口四五重及糊有樂確上二三重地 たこう 硃砂五錢 水銀一 硬肉點紫黑用丹少許鷄翎掃上立刻紅活寫醫若 先將二礬火消研碎入大銅杓內加火消 紅白二丹决難立刻取效 為度再入消礬末 疝 兩 即起研細另將汞珠雄研細至不見星 都察醫宗金鑑 雄黄五錢 皂礬六兩 清四 研与先将陽城曜用紙筋泥塘 啊 盃

炭火二塊使蓋熱曜口封固易乾也用大釘三 塞確口縫間外用熟石膏細末醋調封固盛上加 盏上下用鐵攀鐵絲紮緊用棉 釘地下將確子放釘上確底下置堅大炭火 泥亦可用如有裂紋以確子泥補之極乾再晒 裂紋方入前樂在內確口以鐵油產盖定加鐵 厚全書 | 拾厚陰乾常輕輕撲之不使生裂紋搪泥確子 砌百眼爐升三炷香第一炷香用底火如火 紙燃條蘸蜜周 圍 無

金 灾 D. **飲定四車全書 柳寨醫宗金鑑** 歌白降丹為奪命丹拔膿化腐立時安殊雄汞與 砂入還有消鹽白皂攀若去砌鹽紅升是長肉生 **洩氣盖恐有緑烟起汞走也緑烟一起即無用矣** 滷汁調確子稀泥用筆蘸泥水掃確口周圍勿合 第三炷香火平確口用扇搧之頻頻擦蓋勿令乾 上約有六七錢刮下研極細磁確風用再預以鹽 乾則汞先飛上三香完去火冷定開看方氣足蓋 則汞先飛上二炷香用大半確火以筆熊水擦蓋 华


元珠膏 草烏一銭 柳枝四十九寸 木繁子内十四個盤整八十一個 燃熊送孔内 呼膿腐不净堂之立化 此膏治腫瘍將潰塗之膿從毛孔吸出已開鍼者用 右樂浸七日文火煤枯去渣入巴豆仁三個煎至 肌自不難 蘇油二兩 驢甲片三錢 卷六十二 於定四庫全書 柳篆醫宗金鑑 生肌類方 歌呼膿化為用元珠水繁盤登共柳枝驢甲草馬油 黑傾於鉢内研如泥如麝香一分攪匀入確內收 處復生大疽是知毒未盡不可驟用生肌藥也只 用 重者逼毒内攻輕者反增潰爛雖即次口其於旁 内浸煤枯巴豆麝香施 凡大毒潰爛內毒未盡若驟用生肌則外實內漬







薑礬散 鱼 反 匹 犀 全 書 此散治一切諸瘡發癢者用此撒之甚效 歌輕乳生肌治腐脫石膏血竭乳輕冰若然有水如 不收口加雞內金一錢 龍並收口須添雞內金 右為末撒之 右等分為末先用細茶食鹽煎湯洗之後用此散 乾薑

ķ 腐盡生肌散 三月 歌薑攀最治諸瘡養先用鹽茶煎洗之若是冷瘡不 此散治一切癰疽等毒諸磨破爛不飲者撒上即愈 撒之 **收口乾薑一味撒生肌** 烘生肌甚效 冷瘡不收口者用乾薑一味為末撒患處覺熱如 <u>~</u> d E E 御察醫宗金鑑 乳香 セナ



钦定四軍全書 柳暮翳宗金鑑 月白珍珠散 歌腐盡生肌瘡不飲兒茶乳沒冰麝香血竭三七水 味貼之良一用火煨鹿腿骨為散生肌效甚長 焦色則無用矣為細末撒之生肌甚速 加骨收口珍珠共蟹黄或用猪油溶黄蠟調前七 早三七倍之 加前七味調成膏攤貼癰疽破爛等證若杖傷則 用鮮鹿腿骨紙包灰内煨之以黄脆為度如黑 七土





5日月日丁四 | | | 視之其白如雪約有二两為火候得中之靈藥 先將鹽鉛鎔化入水銀結成砂子再入二礬大消 消三兩辰砂四錢明雄黃三錢 要色紅者用黑鉛九錢水銀一兩枯白礬二兩火 要黄色者加明雄 如要色紫者加硫黄五錢 同妙乾研細入鉛汞再研以不見星為度入確内 泥固濟封口打三炷香不可太過不及一宿取出 凿

於 定日華全書 1 歌五色靈藥白用鹽黑鉛硝汞皂枯礬欲成紫色硫 盡必須添 黄入黄者雄黄加五錢紅去皂鹽鉛重用碌砂飛 升煉火候俱如前法 八升打靈藥硝要炒燥礬要假枯 法凡打出靈藥信如石膏和匀復入新罐內打 方用燒酒煮乾炒燥方研入罐 枝香用之不痛 御纂醫宗全盤 セナニ


生肌王紅膏 當歸二兩 白蠟二兩 膏蓋之大磨洗換二次內無服大補氣血之藥新內 净用根壩挑膏於掌中捺化遍搽新肉上外以太乙 膿時先用甘草湯甚者用豬蹄湯淋洗患上輕網挹 此膏治癰疽發背諸般潰爛棒毒等瘡用在已潰流 即生瘡口自飲此外科收飲藥中之神藥也 J 白芷五銭 卷六十二 粉四錢

k 瓜兒血竭四錢 甘草一兩二錢 右將當歸白正紫草甘草四味入油內浸三日大 滚入血竭化盡次下白蠟微火亦化用茶種四 杓內慢火熬微枯色細絹濾清將油復入杓內煎 研極細輕粉各投一錢攬匀候至一日夜用之極 放水中将膏分作四處傾入鍾內候片時方下 > dula | 御暴醫宗金鑑 麻油一動 紫草二錢 七十四 個

<u>.</u>


5

鱼灰四库全書 輕粉一兩五錢 此膏治溃傷去腐定痛生肌并楊梅瘡杖廉瘡下疳 歌生肌玉紅膏最善潰爛諸療採即收歸芷蠟輕甘 紫草瓜兒血竭共麻油 先將白蠟脂油溶化離火候温入輕粉樟水攪匀 樟水 木 五 錢 豬脂油+兩 卷六十二



冥路小兒急慢驚風一切老幼痢疾俱可貼之凡病 霞捧日病雖危為其人不死如貼樂 處一時後不腫 **炎實大一餅貼印堂之中點官香一枝香盡去藥已** 此樂治男婦大人小兒新久諸病生死難定之間用 不紅皮肉照舊不變謂之白雲漫野病雖輕淺終歸 **冰粉楊碩乳杖并賺磨** 時許視貼樂處有紅斑暈色腫起飛散謂之紅

武 己 口 車 全 書 一 如 築醫宗金鐵 麝香三分 銀朱一錢五分 硃砂三分 用之皆可預知生死也 右各研細於端午日净室中午時共研加油熱脂 餅貼印堂中其功立見用過餅送入河中 為膏磁盒收藏勿經婦人之手臨用豆大一圓捉 巴豆仁不去油 乾蘇仁五分 五靈指三錢





腾銀監生臣洪 策校對官編修臣楊壽楠總校官庶古士臣張能照